



新型コロナウイルス感染症対応 若竹大寿会スタッフニュースレター

ご関係者の皆様
地域の皆様へ

年末年始の注意の4つのポイント

【専門家による今後の見通し】

- ・海外では感染が急拡大、重症者も増加
- ・日本でもオミクロン株の流行の可能性
- ・年末年始の帰省で人の往来が増加
- ・忘年会や新年会など大人数での会食による感染拡大の可能性
- ・介護現場ではこれからワクチンの効果が低下する時期に入る



正月明け新型コロナウイルス感染症が再流行する可能性が非常に高い!!!

対策①
3密（密集・密接・密閉）
を避ける
大人数での飲食は避ける




対策③
年明け体調不良時には
周囲に相談！
必要時は休む



対策②
長時間の飲食



対策④
マスク着用



参考：内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイトより

新型コロナウイルスワクチンの3回目の安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社 (2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社 (2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛 (78.3→83.0%) 疲労 (59.4→63.7%)	疼痛 (78.3→83.0%) 疲労 (59.4→63.7%) 頭痛 (65.4→55.1%)
10-50%	頭痛 (54.0→48.4%) 悪寒 (37.8→29.1%) 筋肉痛 (39.3→39.1%) 関節痛 (23.8→25.3%)	悪寒 (44.3→35.3%) 筋肉痛 (58.1→49.1%) 関節痛 (42.9→41.3%) リンパ節症 (14.2→20.4%)
1-10%	38度以上の発熱 (16.4→8.7%) 腫脹 (6.8→8.0%) 発赤 (5.6→5.9%) リンパ節症※ (0.4→5.2%)	38度以上の発熱 (15.5→6.6%) 腫脹・硬結 (12.3→5.4%) 紅斑・発赤 (8.7→4.8%)

(注) 対象 / 人数: ファイザー2回目 16 ~ 55 歳 / 2,682 人、ファイザー3回目 18 ~ 55 歳 / 289 人
モデルナ2回目 18 歳以上 / 14,691 人、モデルナ3回目 18 歳以上 / 167 人

(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合: 緑 5ポイント以上少ないもの、赤 5ポイント以上多いもの。

(注) 武田 / モデルナ社のワクチンは、1・2回目は 100 μg、3回目は 50 μg 接種している。

(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

参考: 厚生労働省 (追加 (3回目) 接種に使用するワクチンについてのお知らせ)

INFORMATION

【注意!】

新型コロナウイルスワクチン 3回目の「接種券」


が届きます!!!

誤って、捨ててしまわないように!
郵便物にはご注意ください!

郵送されてくる資料

チラシ

予診票



注) 自治体により多少異なります

若竹大寿会ホームページでも、感染症の最新情報や研修動画などをお知らせしています。是非、ご覧ください。



発行: 社会福祉法人 若竹大寿会
住所: 横浜市神奈川区平川町2-4
電話: 045-548-9233
MAIL: main@wakatake.or.jp